

### 8.3.5. Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos (SALSEX)

1. Desde que toma el tratamiento farmacológico, ¿ha notado algún tipo de alteración en la actividad sexual (excitación, erección, eyaculación, orgasmo)?  
Sí  No

---

2. ¿El paciente comunica espontáneamente esta alteración o fue preciso interrogarle expresamente para descubrir la disfunción sexual?  
 Sí (comunicó espontáneamente)  
 No (comunicó espontáneamente)

---

3. ¿Ha notado descenso en su deseo de actividad sexual o en el interés por el sexo?  
0  Ningún problema  
1  Descenso leve. Algo menos de interés  
2  Descenso moderado. Bastante menos interés  
3  Descenso severo. Casi nada o nulo interés

---

4. ¿Ha notado algún retraso en la eyaculación/orgasmo?  
0  Ningún retraso  
1  Retraso leve o apenas apreciable  
2  Retraso moderado y claramente apreciable  
3  Retraso intenso aunque puede eyacular

---

5. ¿Ha notado incapacidad para eyacular o tener orgasmo una vez que comenzó la relación sexual?  
0  Nunca  
1  A veces: menos del 25 % de las ocasiones  
2  A menudo: 25-75 % de las ocasiones  
3  Siempre o casi siempre: más del 75 % de las ocasiones

---

6. ¿Ha notado dificultades de la erección o del mantenimiento de la misma una vez que inicia la actividad sexual? (lubricación vaginal en las mujeres)  
0  Nunca  
1  A veces: menos del 25 % de las ocasiones  
2  A menudo: 25-75 % de las ocasiones  
3  Siempre o casi siempre: más del 75 % de las ocasiones

---

7. ¿Cómo tolera los cambios en la relación sexual?  
1  Bien. Ningún problema por este motivo  
2  Aceptable. Le molesta la disfunción aunque no ha pensado abandonar el tratamiento por este motivo. Interfiere en sus relaciones de pareja  
3  Mal. Le molesta mucho la disfunción sexual. Ha pensado en abandonar el tratamiento por esta causa o interfiere gravemente en las relaciones de pareja